

Speech sound disorders



Speech sound disorders, also called articulation disorders, are diagnosed when a child has trouble saying sounds correctly for their age. A child may replace, skip, add or change sounds in words. Children typically learn speech sounds in a certain order, although it can be different for each child.

Age	Speech Sounds
2 – 3 years old	p, b, m, d, n, h, t, k, g, w, ng, f, y
4 years old	l, j, ch, s, v, sh, z
5 years old	r, zh (as in garage), th (as in that)
6 years old	th (as in thin)



Treatment

Speech sound disorders are treated by a speech-language pathologist (SLP) through speech therapy, which children can receive in outpatient and school settings. The focus of speech therapy is to teach the child how to make different sounds correctly through practice.

Common Questions

Question	Answer
Are speech sound disorders treatable?	Yes, speech sound disorders are treatable and can be improved with speech therapy. Getting help early on leads to the best results.
How long does treatment take?	Treatment will be different for each child. The amount of time depends on how much the child's errors are impacting their speech and how fast they can start improving these errors.
What can families do at home to help their child with their speech?	An SLP can give families ways to help their child's speech development at home. This can include practicing target sounds, words, phrases or sentences. The SLP will provide specific feedback on the child's speech and model correct speech productions.



Riley Children's Health
Indiana University Health

For more information about speech and language disorders, please scan the QR code to visit the Riley Children's website.



စကားသံ ချို့ယွင်းမှုများ



သံပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသော စကားသံ ချို့ယွင်းမှုကို ကလေးတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ အသက်အရွယ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ အသံများကို မှန်ကန်စွာ ထွက်ရှိရန် အခက်အခဲ ရှိသောအခါ ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိပါသည်။ ကလေးတစ်ဦးသည် စကားလုံးများရှိ အသံများကို အစားထိုးခြင်း၊ ကျော်သွားခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကလေးများသည် အများအားဖြင့် အသံများကို အစီအစဉ်အတိုင်း သင်ယူလေ့ရှိကြသော်လည်း ကလေးတစ်ဦးစီအတွက် ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။

အသက်	စကားသံများ
2- 3 နှစ်	p, b, m, d, n, h, t, k, g, w, ng, f, y
4 နှစ်	l, j, ch, s, v, sh, z
5 နှစ်	r, zh (garage တွင် ပါသည့် အသံမျိုး), th (that တွင် ပါသည့် အသံမျိုး)
6 နှစ်	th (thin တွင် ပါသည့် အသံမျိုး)



ကုသမှု

စကားသံချို့ယွင်းမှုကို အပြောအဆိုနှင့် ဘာသာစကားဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (SLP) မှ အပြောအဆိုကုထုံးဖြင့် ကုသပေးပြီး ကလေးများသည် ပြင်ပလူနာဌာနနှင့် ကျောင်းများတွင် ကုသမှု ခံယူနိုင်သည်။ အပြောအဆိုကုထုံး၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက် မှာ ကလေးကို လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် မတူညီသော အသံများကို မှန်ကန်စွာ ထွက်ရှိအောင် သင်ကြားပေးရန် ဖြစ်သည်။

မေးများသော မေးခွန်းများ

မေးခွန်း	အဖြေ
စကားသံချို့ယွင်းမှုများကို ကုသနိုင်ပါသလား။	စကားသံချို့ယွင်းမှုများကို ကုသနိုင် ပြီး အပြောအဆိုကုထုံးဖြင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်။ စောစောစီးစီး အကူအညီရယူခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ရလဒ်များကို ရရှိစေသည်။
ကုသမှုသည် မည်မျှကြာသနည်း။	ကုသမှုသည် ကလေးတစ်ဦးစီအတွက် ကွဲပြားပါသည်။ အချိန်ပမာဏမှာ ကလေး၏ ချို့ယွင်းမှုများသည် ၎င်းတို့၏ အပြောအဆိုအပေါ် မည်မျှအထိ သက်ရောက်မှုရှိပြီး ၎င်းတို့သည် ထိုချို့ယွင်းမှုများကို မည်မျှ မြန်မြန် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည့်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။
မိသားစုများသည် ၎င်းတို့ ကလေး၏ အပြောအဆိုပိုင်း ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် နေအိမ်တွင် မည်သို့သော အကူအညီများ ပေးနိုင်ပါသနည်း။	SLP သည် မိသားစုများအား ၎င်းတို့၏ ကလေးငယ်၏ အပြောအဆို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် နေအိမ်တွင် ကူညီနိုင် မည့် နည်းလမ်းများကို ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် လေ့ကျင့်ရန် ပစ်မှတ်ထားသည့် အသံများ၊ စကားလုံးများ၊ စကားစု များ သို့မဟုတ် ဝါကျများကို လေ့ကျင့်ခြင်း ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ SLP သည် ကလေး၏ အပြောအဆိုနှင့်ပတ်သက်၍ တိကျသော တုံ့ပြန်ချက်များ ပေးမည်ဖြစ်ပြီး မှန်ကန်သော အပြောအဆိုပုံစံများကို ပြသပေးမည်ဖြစ်သည်။



Riley Children's Health
Indiana University Health

For more information about speech and language disorders, please scan the QR code to visit the Riley Children's website.

